

## 9. gyakorlat

A korai kötődés, anya -

gyermek kapcsolat

Az elsődleges funkció fontosságára hamar rájött a psz-usb, és ez központi kérdés lett a pszichológia - lélettanban.

Elsődleges kötődés az a kb. fél éves korra kialakuló erős kommunikációs és testi kapcsolat, amely a éisgyermek méret az anyához fűzi, és amelynek a éisgyermek más tagjai és az idegenek egyértelműen nem tagjai. (Az anya fogalmát felválthatja egy gondozóval.)

- Megfigyelés, hogy ha nem alakul ki az elsődleges kötődés nem alakul ki, azaz testi és pszichés tünetek jelentkeznek és jelekesek.

+ Első dolog, amiből rájött, h. az anya-gy. kapcsolatra: kényelmet éll felténi: büntőítet vizsgálva felfedezés v. az anya teljes hiánya v. valamilyen konfliktust az anyával.

Az anya-gy. é. hiánya v. megféle kihat a további életre

+ Másik dolog: a lelkeésőben lévő gyereket vizsgálata: oda jutottak, h. a további fejlődésben vani hátrálódás, wepálé ... stb. az anya-gyermek kapcsol. hiánya miatt.

- amikor a gyermek megszületik  $\Rightarrow$  "életképlet" (nem tudja magát elátni, venélyt elhántani, veszélyes helyzetből élesíteni)

- Eialatul a babának a BIZTONSÁG ÉS ÜKÉGLLET  $\Rightarrow$  legyen anyja v. gondozó, aki biztosítja az életbenmaradását.  
 $\Downarrow$  (biztonságérzet eialatul)

alapja, hogy a többi primér funkció normál körülményben, normál módon fejlődhesen.

Ha ez nem kejesül, akkor bizonytalan állapot alakul ki, és ez ékhat a további pszichés funkciók fejlődésére.

Eszéletek: Az anya kidnyát demonstrálja.

$\hookrightarrow$  állatorozal végzetés (Harlow - Rhesus)

Harlow: ő végzetés a legyöklé eszéletek

a, kejes izolációs eszéletek  
 $\hookrightarrow$  (elválasztás)

mitéki után vély órával a majmóret elválasztottól az anyjától, él. még fajtánakkal sem érintkezett.

b, kejes izolációs eszéletek:

elvetél az anyjától a majmóret, de láthatja és hallhatja a fajtánsait.

c, két anya eszéletek:

2 félc anyya  $\Rightarrow$  nőanya  
 $\rightarrow$  döt v. félanya

itt is elválasztottól az anyjától a majmóret,

és v. a nőanya v. a félanya "nevelte".

dyau ekebeu tartotta Harlow a majmokat,  
ahol mindket „anya” ott volt. (# Tejtáplálás be-  
vezetése is vezetett)

Attól 15 órát töltött a majmó a nőrangába  
mimantólva és csak 2 órát a drótanyáé.

Ha csak a drótanyáé volt kijáratály, akkor is él.  
és volt a helyzet.

Levonható: -nem fontos a táplálás  
-fontos a biztonságérzés  
-a testi kontaktus (az a-gy. kapcsolatot lényeges  
vonása, mert ebben a korban ez elégíti  
ki a biztonsági igényt.)

### Játékvédelem vizsgálata

Harlow egy dobolós éismacskát ráz a ekebe.

keresés → a gyereket és az anyjához megy, ott meg-  
nyugszik, felkelti a évdősiságot, és megbant-  
ozik (a féltékeny féltésesednie a évdősiságot.)

### NORMÁL ANYA-GY. KAPCSOLAT

→ FEMANYÁN NEVELKEZETT: a majmó pávissas-  
sát mutatja, és nem voltak hajlandóak  
játsszani, odameenni sem, amíg ott volt a  
macskó. → AZ ELSZIGETELT NEVELÉS NÉL IS!

⇒ Minis jelen a nőrangja: dermedten kapcsolata,  
mimogató... ⇒ féltékeny keresés. Itt sem alarul ki a  
játékvédelem.

Va jelen volt a nőránya, akkor és, ugyanez történt, mint a rendszer anyjával.

## NŐRANYÁVAL NEVELKEDŐ

Egy normál manipuláció akkor alakul ki, ha van biztonságérzet, és van elvárás a biztonságigény.

Harlow: Helyező kísérlet (továbbírta a kísérleteit.)

Az anyjával volt, de csak 1 és egy volt, ami 1 és 0 s érette vezetett, ott jött a kísérlet.

Megjelenítés:

Anyjával nevelkedés: az saját anyjával nevelkedés és oda csúszott.

Nőrányával ... kijelen mindanny, u. ková nevelkedés, a legközelebbi nőrányába csúszott.

Levelet: A anya-gyermek kapcsolat elsődleges, egyedi és felismerhetetlen.

További kísérlet következményei:

- kísérlet (a norm. anya-gyermek kapcsolat) akkor, hogy a levelet folyamata megindulhasson

Megfigyelés: - norm. szűz - ban 2 éves korban, megindul a levelet, míg a nőrányán 2,5 éves korban is ugyanazt időt tölt.

Megfigyelés: norm. nemi élet

- azo, azo elnökelo u. pótközelo uötter fel, emelke a nemi kapcsolatot

- a „veszélyes felvett” majordóló ról a anyák letter az anyai magatartást nem tanulja meg.
- nem tudtak társas épisoletoit éialerítani
- nem tudtak jól megálatni a társára
- dnepnyersdié a uimifájul

### Emberi megfigyelés:

Spitz: „világh. tájékoz. a lelkiaiban lévő gyereket figyelt meg → összehasonlította a norm. éonüvélyes éonüvély felvett gyerekekkel.

(mozgás, észlelés, épisoletoit, manipuláció)

- uelék a uelöotthoni gyereket  
(jó higiénias éonüvély, megfelelő táplálék megfelelő ellátás és fizikai éonüvély)
- otthoni gyereket  
(rossz higiénias éonüvély, nem megfelelő táplálék és egyéb áronst a uelüvély)

Köv: a fejlődés normál ütemben zajlott nemben a uelöotthonban uelkedő gyerekekkel.

↳ Nem az nülük, h. it énis, uelör..., hanem  
(a nülük, ill. anya jelenléte, épisoletoit  
→ az énelmi élet fontosabb, mint a tárgyi éonüvély.

- a, uelöotthon
- b, anya börtönben volt a gyerekek együtt
- c, családban felüvő (halásfalu)
- d, → (városban)

Ebből 3 megdneve conyformán fejlődött,

A lelenchokias fejlődése 40%-kal visszacsúsz, a

többi 3-t normálisan neveshető.

ha 3-5 hónapig érik van  
anya mellett, de utána visszajön  
az anya, és még visszafordít-  
ható, visszajön a  
Gáborpálé tovább marad  
anya mellett 3 hónapot  
míg eléri a fejlődés fokozatát.

Ezt a jelenséget Spitz hospitalizációs nevetk-el is hívják.

a gyermek: erőszakkal lenner  
jell. a kompulzálás  
sírás csökkenése  
fogadás

a későbbi fejlődésben van a legnagyobb elmaradás

Családban felülvizsgáló gyermekorvos, de mégis párosított  
vizsgálatok. → őre kijött ismeri elhanyagolási, ami  
ast jelenti, u. tudatlanság zajlik.

Minden anyának van érdeklődése a gyermekéről, és ezért  
mindent megtén, u. ilyenkor lássa. Az anya mindent  
megtén, de a gyermek nem olyan, mint azt az anya  
sajná. A gyermek pedig nem azt érezi, ahogy a nő  
nézi. Családban mindkettőben abban az anya-  
gyermek kapcsolatban.

pl.: anyának meglát a béres kislány  
nem sokra rá nézhet egy másik fia

Az anya elvárásai (kijelent), u. kapcsolatban a volt  
fiata, u. legyen nagyon Tolyan. Ugy is viselkedik  
dél vele.

pl.: édesanyjának érzékelés előtt is, de normál

az -99. kapcsolatban felülvizsgáló gyermekorvos is megvár  
határoz a fejlődés visszacsúszásától.